

Rediar

რედიარი

ეფექტური დაცვა დიარეისგან



რა არის Rediar-ი


Farm-O-San Rediar-ი საკვებიდანამატია ხბოებისთვის, რომელიც აღადგენს წყლის და ელექტროლიტების ბალანსს, გამოწვეულს დიარეით, Rediar-ი ნაწლავებში წარმოქმნის გელისებურ მასას ხოლო პრობოტიკს შემცველობა აღადგენს კუჭ-ნაწლავის ბაქტერიულ ბალანსს. გამოიყენეთ Rediar-ი 6 თვემდე ხბოს კუჭ-ნაწლავის სისტემის აშლილობისას (დიარეის - ფაღარათისას).

დიარეა უფრო მეტ სიკვდილიანობას იწვევს ხბოებში ვიდრე სხვა შემთხვევები

ნეონატალური დიარეა (ფაღარათი), მოითხოვს უმთავრეს ყურადღებას ხბოს სიცოცხლის პირველი რამოდენიმე კვირის განმავლობაში, ხბოების სიკვდილიანობის ნახევარი ხომ დიარეაზე

(ფაღარათზე) მოდის.

(იხილეთ ხბოს სიკვდილიანობის მიზეზები)



დღიარის საფრთხე

დღიარით გამოწვეული დეჰიდრატაცია (გაუწყლოვება) ხბოს სიკვდილის მიზეზია

მნიშვნელოვანია დღიარის და დეჰიდრატაციის ნიშნების რაც შეიძლება სწრაფად აღმოჩენა კარგი საპრევენციო პროგრამა საგრძნობლად ამცირებს დღიარის ზეგავლენას ხბოებზე!



დღიარის ან დეჰიდრატაციის ნიშნების შემჩნევისას დაუყოვნებლივ გამოიყენეთ ელექტროლიტების შემცველი პროდუქტი, ისეთი როგორც არის Farm-O-San Rediar-ი. რომლის დროული გამოყენებაც გაზრდის ხბოს გამოჯანმრთელების შანსებს.

Rediar-ის ხბოსთვის მიწოდების წესი

• კუჭ-ნაწლავის სისტემის უმნიშვნელო აშლილობის პირველსავე ნიშნებისას გააგრძელეთ ხბოს გამოკვება რძით/რძის შემცველით ჩვეულებისამებრ, უბრალოდ დაუმატეთ 1 ლიტრ რძეს/რძის შემცველს 25გ. Rediar-ი.

ასევე შესაძლებელია: Rediar-ის ხსნარის მომზადება, 50გ. Rediar 1 ლიტრ წყალში (40°C) გახსენით და აღნიშნული ხსნარის რძით/რძის შემცველით კვებებს შორის გამოიყენეთ. მკურნალობის პერიოდი მაქსიმუმ 3 დღე.

• მეტად გართულებულ შემთხვევებში გამოტოვეთ რძით/რძის შემცველით ორი კვება და სამაგიეროდ მიანოდეთ ხბოს Rediar-ის ხსნარი ნებაზე (რამდენსაც დალევს). შემდეგ თანდათანობით აღადგინეთ ხბოს რძით/რძის შემცველით კვება 1.5-2 ლიტრით 3-ჯერ დღის განმავლობაში, Rediar-ის 25 გრამის დამატებით ყოველ 1 ლიტრ რძე/რძის შემცველზე.

ასევე შესაძლებელია: თანდათანობით აღადგინეთ ხბოს რძით/რძის შემცველით კვება 1.5-2 ლიტრით 3-ჯერ დღის განმავლობაში, ხოლო ამ კვებებს შორის ხბოს მიანოდეთ Rediar-ის ხსნარი 2-3 დღის განმავლობაში.

თუ Rediar-ს გამოიყენებთ რძით/რძის შემცველში ჩართვით ხბოებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა სასმელ წყალთან ნებაზე!!!

მომზადების წესი

მომზადების წესი

Rediar -ის შერევა რძეში/რძის შემცველში

- > მოამზადეთ რძის შემცველი ჩვეულებისამებრ
- > შეურიეთ რძეს/რძის შემცველს 1 ლიტრზე 25 გ Rediar -ი.

Rediar -ის შერევა წყალში

- > გამოიყენეთ 40°C მდე შემთბარი წყალი
- > ერთ ლიტრ წყალს დაუმატეთ 50გ Rediar -ი
- > გამოიყენეთ Rediar -ის ხსნარი მომზადებისთანავე, ხსნარის მეტად გასქელების ასარიდებლად.